

【為防範醫療機構傳播風險，請醫療機構落實感染管制措施、加強疑似個案通報採檢及儘速施打疫苗-疾管署】2021.4.29

公文

因應國內發生某航空公司機師感染案，且發生 COVID-19 本土感染個案疫情，該事件中疫調發現於防疫旅館服務之確診個案曾多次至診所就醫。由於 COVID-19 感染個案臨床症狀多屬非特異之發燒或呼吸道症狀，為避免發生未確實詢問 TOCC，造成個案未即時採檢或轉診就醫之情事，請醫療機構落實感染管制措施、加強疑似個案通報採檢及儘速施打疫苗：

- 一、本中心訂有「醫療機構因應 COVID-19 感染管制措施指引」，以提供醫療院所依臨床實務及現況所需，參考內化於臨床作業流程中落實執行。醫療院所應規劃病人分流，並依本中心訂定之「[COVID-19 病人風險評估表](#)」落實詢問 TOCC，除可利用健保卡插卡查詢高風險職業名單，另應加強詢問就醫民眾是否曾接觸來自國外人士，或本身為具較高職業暴露風險者(如：需要近距離接觸不特定對象或可能感染 SARS - COV-2 但尚無症狀之人員、進出高風險場所之工作人員等職業別)。
- 二、若發現疑似個案，應立即分流，並請依循「醫療院所因應 COVID-19 分流就醫及轉診建議」處理。倘經醫師評估符合採檢對象時，請醫療院所安排個案轉診至指定社區採檢院所就醫。
- 三、近期美國、英國等歐美國家進行之大規模臨床試驗及實施接種計畫後追蹤研究顯示，AstraZeneca COVID-19 疫苗能預防 COVID-19 感染，以及感染後重症、住院及死亡的風險，接種疫苗可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。接種後即使感染，可有效縮短病毒陽性天數，且病毒量較低。因此請醫療照護工作人員儘速施打疫苗，以降低自己和周遭人員感染的風險，保護自我的健康。